

# Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## SILVAYSAN Kapseln

Wirkstoff: Trockenextrakt aus Mariendistel Früchten



### Zusammensetzung:

1 Kapsel enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil:

136,0-160,0 mg Trockenextrakt aus Mariendistel Früchten (50-70 : 1) entsprechend 110 mg Silymarin, berechnet als Silibinin (Auszugsmittel: Aceton).

Normierungsmaterial: Glucose-Monohydrat 0 bis 24 mg.

Sonstige Bestandteile: Glucose-Monohydrat, hochdisperses Siliciumdioxid, Lactose 1H<sub>2</sub>O, Magnesiumstearat, Gelatine, Natriumdodecylsulfat.

**Darreichungsform und Inhalt:** Originalpackungen mit 20 und 100 Kapseln.

**Stoffgruppe:** Pflanzliches Arzneimittel bei Lebererkrankungen.



### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

**SANUM-KEHLBECK**  
GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung  
Postfach 1355 · D-27316 Hoya

**Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen, Leberzirrhose und toxischen Leberschäden.

**Hinweis:** Bei Gelbsucht (hell- bis dunkelgelbe Hautfärbung, Gelbfärbung des Augenweiß) ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich. Bei akuten Vergiftungen ist unbedingt ein Arzt aufzusuchen. Die Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen.

### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie SILVAYSAN® nicht anwenden?*

Sie dürfen **SILVAYSAN®** nicht einnehmen bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Zur Anwendung von **SILVAYSAN®** während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. **SILVAYSAN®** soll deshalb bei Schwangeren und stillenden Müttern nicht angewendet werden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

*Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?*

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

*Worauf müssen Sie noch achten?*

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** Keine bekannt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **SILVAYSAN**<sup>®</sup> anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren dreimal täglich 1 Kapsel mit etwas Wasser ein.

*Wie und wann sollten Sie **SILVAYSAN**<sup>®</sup> einnehmen?*

Die Kapseln können unzerkaut oder zerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (z.B. ein Glas Wasser) mehrmals täglich wie oben angegeben eingenommen werden.

*Wielange sollten Sie **SILVAYSAN**<sup>®</sup> einnehmen?*

Die Anwendung des Arzneimittels ist nicht prinzipiell begrenzt; über die Dauer der Anwendung sollte jedoch der Arzt entscheiden. Sollten trotz der Einnahme von **SILVAYSAN**<sup>®</sup> die Beschwerden fortbestehen, sollte der Arzt aufgesucht werden.

*Was ist zu beachten, wenn **SILVAYSAN**<sup>®</sup> in zu großen Mengen angewendet wurde?*

Von den pflanzlichen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

### **Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **SILVAYSAN**<sup>®</sup> auftreten?*

Vereinzelt wird eine leicht abführende Wirkung beobachtet. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Sollten Sie die genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, soll **SILVAYSAN**<sup>®</sup> nicht nochmals eingenommen werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Blisterstreifen und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

**Stand der Gebrauchsinformation:** 01. 02. 2001.

---

**Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!**  
**Apothekenpflichtig!**